

Logopedische behandeling spraak

Vaak zijn klachten van onverstaanbaarheid een reden om naar logopedie te gaan. Er kan sprake zijn van een vertraagde spraakontwikkeling of een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Andere problemen met spraak zijn: nasaliteit, dysartrie, slissen, stotteren en broddelen. Deze en/of andere spraakproblemen kunnen ook voorkomen o.a. een aangezichtsverlamming en spierziekten zoals ALS.

Kinderen

In de logopedische behandeling van *kinderen* gebruik ik directe en/of indirecte therapie. Bij indirecte therapie leg ik u uit hoe u uw kind tot spreken kunt stimuleren. Bij directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. Dit gebeurt op speelse wijze zodat er plezier in het spreken ontstaat en blijft. De ouders of verzorgers van het kind worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in het gezin van het kind. Maar vooral: wat kan uw kind al wél? Van daaruit begint mijn handelen.

Volwassenen

Bij de behandeling van *volwassenen* staat het verbeteren van de verstaanbaarheid ook centraal. U leert optimaal gebruik te maken van uw mogelijkheden. Vanuit een juiste, symmetrische lichaamshouding worden mondmotoriek (belangrijk bij het eten, drinken en spreken), de uitspraak, de ademhaling en de stemgeving behandeld. De resultaten van de behandeling zijn mede afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte of aandoening.